

**PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS A BASE DE
DICLOFENACO POTASICO Y SODICO, EN DIVERSAS FARMACIAS DEL SECTOR
DE BETHANIA Y PARQUE LEFEVRE , EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL DÍA 22 DE
JUNIO DE 2009**

I. ANTECEDENTES¹

El diclofenaco se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez ocasionados por la osteoartritis (artritis debida al desgaste del revestimiento de las articulaciones), la artritis reumatoide (artritis debida a la inflamación del revestimiento de las articulaciones) y la espondilitis anquilosante (artritis que afecta principalmente la columna vertebral). Las tabletas de diclofenaco de liberación inmediata (acción inmediata) también se usan para tratar los periodos menstruales dolorosos y los dolores por otras causas. El diclofenaco pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroides (AINE). Actúa impidiendo que el organismo produzca una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

El diclofenaco se usa regularmente para tratar el dolor leve a moderado posterior a cirugía o tras un proceso traumático, particularmente cuando hay inflamación presente. El fármaco es efectivo contra el dolor menstrual.

También se usa a veces para tratar el dolor causado por la gota, problemas en el hombro y el cáncer. Consulte a su médico sobre los posibles riesgos de usar este medicamento para tratar su afección.

Está contraindicado en pacientes que han tenido asma, urticaria o rinitis aguda.

Como la mayoría de medicamentos, el fármaco diclofenaco tiene riesgos y beneficios. Su médico ha ponderado, antes de prescribírselo, ambos extremos. Cualquier cuestión adicional acerca de este u otros fármacos debe consultarlo con el médico que le atiende.

II. OBJETIVOS

La presente recopilación de venta al consumidor tiene como objetivo informar al consumidor sobre las marcas y los precios existentes en el mercado local, al momento de comprar Diclofenaco. Por tal motivo la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, recopiló el día 22 de Junio de 2009, precios de venta al público de algunos, diclofenaco, sódicos y potásicos, obtenidos en diversas farmacias de el sector de Bethania y Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá.

¹<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a689002-es.html>

III. METODOLOGIA

Se ha utilizado la técnica de muestreo no probalístico de juicios, en la cual con base en la experiencia de visitar los locales (o cadenas) comerciales, al igual que observar las marcas, se ha hecho una elección empírica.

Las variables consideradas en el presente monitoreo fueron:

- ◆ Producto
- ◆ Presentación
- ◆ Precios.

Las Farmacias consideradas fueron:

Bethania	Parque Lefevre
Farmacia Healt Store (Dorado)	Farmacia San Gerardo (Chanis)
S/M Rey (Dorado)	Súper 99 (Chanis)
Farmacia Metro (Dorado)	Farmacia Metro (Chanis)
Farmacia Arrocha (Tumba Muerto)	S/M Rey (Chanis)

IV. ANÁLISIS DE PRECIOS

El monitoreo realizado nos refleja que existen en el mercado variedad de diclofenaco en diferentes presentaciones de diferentes marcas y precios.

Definición	Sector / Farmacia			
	Parque Lefevre		Bethania	
	Precio (B/.)	Farmacia	Precio (B/.)	Farmacia
Medicamento	Cataflan Novartis		Cataflan Novartis	
Presentación	Caja con 50 de 50mg		Caja con 50 de 50 mg	
Precio más bajo	0.79	S/M Rey Chanis	0.83	R/M Rey Dorado
Precio más alto	0.97	San Gerardo Chanis	0.92	Metro Dorado
Medicamento	Diclofenaco Sódico La Santé		Diclofenaco Sódico La Santé	
Presentación	Caja con 50 de 50mg		Caja con 50 de 50mg	
Precio más bajo	0.24	S/M Rey Chanis	0.24	S/R Rey Dorado
Precio más alto	0.36	San Gerardo Chanis	0.32	Healt Store Dorado

V. ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR²

Advertencias a la hora de tomar diclofenaco:

- ✓ Las personas que toman antiinflamatorios como el diclofenaco, pueden tener mayor riesgo de sufrir un ataque cardiaco que quienes no lo toman.
- ✓ Si le van a hacer un tipo de cirugía cardiaca, no debe tomar diclofenaco ni antes, ni justo después de la cirugía.
- ✓ El diclofenaco puede causar úlceras, sangrado o perforaciones en el estomago o el intestino.
- ✓ El diclofenaco puede provocar efectos secundarios como: diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, hinchazón, vómitos, comezón, fiebre, dificultad para respirar, otros.
- ✓ Si tiene algún síntoma, ocasionado por el diclofenaco, deje de tomarlo y consulte de inmediato a su medico.
- ✓ El uso del diclofenaco a largo plazo predispone a la aparición de úlceras.

Lo que todo paciente debe saber:

- La selección del medicamento es responsabilidad única del medico.
- Verifique la fecha de vencimiento de los medicamentos.
- No permita que otra persona utilice sus medicamentos.
- No tome ningún tipo de medicamento si es alérgico a algunos de los ingredientes activos o no activos del mismo.
- No tome ningún tipo de medicamento si esta embarazada o si cree estarlo.

² <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a689002-es.html#how>